

Definición de derivada

Ejercicio nº 1.-

Halla la tasa de variación media de la siguiente función en el intervalo $[1, 2]$ e indica

$$f(x) = 2x^2 - 3x$$

Ejercicio nº 2.-

Calcula, utilizando la definición de derivada, $f'(1)$ para la función $f(x) = \frac{x-1}{3}$.

Ejercicio nº 3.-

Utilizando la definición de derivada, calcula $f'(x)$ para la función $f(x) = \frac{x+1}{3}$.

Ejercicio nº 4.-

Halla la función derivada de:

a) $f(x) = 3x^4 - 2x + 5$

b) $f(x) = e^x$

Ejercicio nº 5.-

Halla la función derivada de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \frac{x^2 + 2}{2x + 1}$

b) $f(x) = xe^x$

Ejercicio nº 6.-

Calcula la derivada de la función:

$$f(x) = \sqrt{4x^3 + 1}$$

Ejercicio nº 7.-

Consideramos la función:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{2}$$

Halla la tasa de variación media en el intervalo $[0, 2]$ e indica si $f(x)$ crece o decrece en ese intervalo.

Ejercicio nº 8.-


a) Calcula la tasa de variación media de la función $f(x) = \frac{3}{x}$ en el intervalo $[-3, -1]$

b) A la vista del resultado obtenido en el apartado anterior, ¿crece o decrece la función en dicho intervalo?

Ejercicio nº 9.-

Calcula la tasa de variación media de esta función, $f(x)$, en los intervalos siguientes e indica si la función crece o decrece en cada uno de dichos intervalos:

- a) $[-1, 0]$
- b) $[1, 2]$



Ejercicio nº 10.-

Utilizando la definición de derivada, calcula $f'(-1)$, siendo $f(x) = \frac{3x+1}{2}$.

Ejercicio nº 11.-

Aplicando la definición de derivada, calcula $f'(1)$, siendo $f(x) = \frac{2}{x}$.

Ejercicio nº 12.-

Calcula, utilizando la definición de derivada, $f'(1)$ para la función $f(x) = \frac{x-1}{3}$.

Ejercicio nº 13.-

Halla la derivada de la función $f(x) = (x-1)^2$ en $x = 2$, aplicando la definición de derivada.

Ejercicio nº 14.-

Halla la derivada de la siguiente función en $x = 1$, aplicando la definición de derivada:

$$f(x) = x^2 + 1$$

Ejercicio nº 15.-

Halla la derivada de la función $f(x) = 2x^2$, aplicando la definición de derivada

Ejercicio nº 16.-

Utilizando la definición de derivada, calcula $f'(x)$ para la función $f(x) = \frac{x+1}{3}$.

Ejercicio nº 17.-

Halla $f'(x)$, aplicando la definición de derivada, siendo $f(x) = x^2 + 1$.

Ejercicio nº 18.-

Aplicando la definición de derivada calcula $f'(x)$, siendo $f(x) = \frac{1}{x}$.

Cálculo de derivadas

Ejercicio nº 19.-

Halla la función derivada de:

a) $f(x) = 4x^3 - 3x^2 + 2$

b) $f(x) = \operatorname{tg} x$

Ejercicio nº 20.-

Calcula la función derivada de:

a) $f(x) = 2x^3 - x^2 + 1$

b) $f(x) = \ln x$

Ejercicio nº 21.-

Halla la derivada de:

a) $f(x) = x^3 - 3x^2 + \frac{1}{5}$

b) $f(x) = \cos x$

Ejercicio nº 22.-

Halla la función derivada de las siguientes funciones:

a) $f(x) = 2x^5 + \frac{x}{3}$

b) $f(x) = \operatorname{sen} x$

Ejercicio nº 23.-

Halla la función derivada de:

a) $f(x) = 3x^4 - 2x + 5$

b) $f(x) = e^x$

Ejercicio nº 24.-

Calcula $f'(x)$ en cada caso:

a) $f(x) = \frac{3x^2}{2x+3}$

b) $f(x) = \sqrt[3]{x} \cdot \operatorname{sen} x$

Ejercicio nº 25.-

Halla la función derivada de:

a) $f(x) = \frac{1 - x^2}{x - 3}$

b) $f(x) = x \ln x$

Ejercicio nº 26.-

Calcula la derivada de las funciones siguientes:

a) $f(x) = \frac{3x - 1}{x^2 - 2}$

b) $f(x) = x^2 \operatorname{sen} x$

Ejercicio nº 27.-

Halla la función derivada de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \frac{x^2 + 2}{2x + 1}$

b) $f(x) = xe^x$

Ejercicio nº 28.-

Halla la derivada de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \sqrt{x} + \frac{2}{x}$

b) $f(x) = \frac{3x + 1}{e^x}$

Ejercicio nº 29.-

Halla la derivada de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \sqrt{x} + \frac{2}{x}$

b) $f(x) = \frac{3x + 1}{e^x}$

Ejercicio nº 30.-

Calcula la derivada de la función:

$$f(x) = \sqrt{4x^3 + 1}$$

Ejercicio nº 31.-

Halla la función derivada de:

$$f(x) = (3x^2 + x)^4$$

Ejercicio nº 32.-

Halla $f'(x)$ para la función:

$$f(x) = e^{4x^3 - 2x}$$

Ejercicio nº 33.-

Calcula la función derivada de:

$$f(x) = \operatorname{sen}\left(\frac{x+1}{2x-3}\right)$$

Aplicaciones de la derivada

Ejercicio nº 34.-

Escribe la ecuación de la recta tangente a la curva $y = 2x^2 - 3x$ que tenga pendiente -7 .

Ejercicio nº 35.-

Halla la ecuación de la recta tangente a la curva $y = \sqrt{x}$ que sea paralela a la recta $y = \frac{1}{4}x + 1$

Ejercicio nº 36.-

Halla la ecuación de la recta tangente a la curva $y = x^2 + 2x - 1$ en el punto de abscisa $x = 1$.

Ejercicio nº 37.-

Escribe la ecuación de la recta tangente a la curva $y = x^3 - 2x$ en el punto de abscisa $x = 2$.

Ejercicio nº 38.-

Halla la ecuación de la recta de pendiente 7 que es tangente a la curva $y = 3x^2 + x - 1$.

Ejercicio nº 39.-

Averigua los puntos de tangente horizontal de la función:

$$f(x) = \frac{3 - x^2}{x + 2}$$

Ejercicio nº 40.-

Halla y representa gráficamente los puntos singulares de la función:

$$f(x) = x^4 - 2x^2$$

Ejercicio nº 41.-

Determina los puntos de tangente horizontal de la función:

$$f(x) = \frac{x^3}{x+2}$$

Ejercicio nº 42.-

Halla los puntos de tangente horizontal de la siguiente función y, con ayuda de las ramas infinitas, decide si son máximos o mínimos:

$$f(x) = x^3 + 6x^2 - 15x$$

Ejercicio nº 43.-

Halla y representa gráficamente los máximos y mínimos de la función:

$$y = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$$

Ejercicio nº 44.-

Dada la función:

$$f(x) = 2x^3$$

determina los tramos en los que la función crece y en los que decrece.

Ejercicio nº 45.-

Estudia el crecimiento y el decrecimiento de la siguiente función:

$$f(x) = 3x^2 - 2x + 1$$

Ejercicio nº 46.-

Estudia dónde crece y dónde decrece la función:

$$f(x) = 3 + 12x - 3x^2$$

Ejercicio nº 47.-

Estudia el crecimiento y el decrecimiento de la función:

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 1}{2}$$

Ejercicio nº 48.-

Halla los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función:

$$f(x) = (x+2)^2$$

SOLUCIONES

Definición de derivada

Ejercicio nº 1.-

Halla la tasa de variación media de la siguiente función en el intervalo [1, 2] e indica

$$f(x) = 2x^2 - 3x$$

Solución:

$$T.V.M.[1, 2] = \frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = \frac{2 - (-1)}{1} = \frac{(2 + 1)}{1} = \frac{3}{1} = 3$$

Como la tasa de variación media es positiva, la función es creciente en el intervalo [1, 2].

Ejercicio nº 2.-

Calcula, utilizando la definición de derivada, $f'(1)$ para la función $f(x) = \frac{x-1}{3}$.

Solución:

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1+h-1}{3} - 0}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h}{3}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Ejercicio nº 3.-

Utilizando la definición de derivada, calcula $f'(x)$ para la función $f(x) = \frac{x+1}{3}$.

Solución:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{x+h+1}{3} - \frac{(x+1)}{3}}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{x+h+1-x-1}{3}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h}{3}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{3h} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Ejercicio nº 4.-

Halla la función derivada de:

a) $f(x) = 3x^4 - 2x + 5$

b) $f(x) = e^x$

Solución:

a) $f'(x) = 12x^3 - 2$

b) $f'(x) = e^x$

Ejercicio nº 5.-

Halla la función derivada de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \frac{x^2 + 2}{2x + 1}$

b) $f(x) = xe^x$

Solución:

a) $f'(x) = \frac{2x(2x+1) - (x^2 + 2) \cdot 2}{(2x+1)^2} = \frac{4x^2 + 2x - 2x^2 - 4}{(2x+1)^2} = \frac{2x^2 + 2x - 4}{(2x+1)^2}$

b) $f'(x) = e^x + xe^x = (1+x)e^x$

Ejercicio nº 6.-

Calcula la derivada de la función:

$$f(x) = \sqrt{4x^3 + 1}$$

Solución:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{4x^3 + 1}} \cdot 12x^2 = \frac{12x^2}{2\sqrt{4x^3 + 1}} = \frac{6x^2}{\sqrt{4x^3 + 1}}$$

Ejercicio nº 7.-

Consideramos la función:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{2}$$

Halla la tasa de variación media en el intervalo $[0, 2]$ e indica si $f(x)$ crece o decrece en ese intervalo.

Solución:

$$\text{T.V.M. } [0, 2] = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{\frac{3}{2} - \left(\frac{-1}{2}\right)}{2} = \frac{\frac{3}{2} + \frac{1}{2}}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

Como la tasa de variación media es positiva, la función crece en ese intervalo.

Ejercicio nº 8.-

a) Calcula la tasa de variación media de la función $f(x) = \frac{3}{x}$ en el intervalo $[-3, -1]$

b) A la vista del resultado obtenido en el apartado anterior, ¿crece o decrece la función en dicho intervalo?

Solución:

$$\text{a) T.V.M. } [-3, -1] = \frac{f(-1) - f(-3)}{-1 - (-3)} = \frac{-3 - (-1)}{-1 + 3} = \frac{-3 + 1}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$


b) Como la tasa de variación media es negativa, la función es decreciente en el intervalo dado.

Ejercicio nº 9.-

Calcula la tasa de variación media de esta función, $f(x)$, en los intervalos siguientes e indica si la función crece o decrece en cada uno de dichos intervalos:

a) $[-1, 0]$

b) $[1, 2]$



Solución:

$$\text{a) T.V.M. } [-1, 0] = \frac{f(0) - f(-1)}{0 - (-1)} = \frac{1 - (-1)}{1} = \frac{1 + 1}{1} = 2$$

Como la tasa de variación media es positiva, la función es creciente en $[-1, 0]$. (También se puede apreciar directamente en la gráfica).

$$\text{b) T.V.M. } [1, 2] = \frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = \frac{0 - 2}{1} = -2$$

La función decrece en este intervalo.

Ejercicio nº 10.-

Utilizando la definición de derivada, calcula $f'(-1)$, siendo $f(x) = \frac{3x+1}{2}$.

Solución:

$$\begin{aligned} f'(-1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1+h) - f(-1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{3(-1+h)+1}{2} - \frac{-2}{2}}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{-3+3h+1}{2} + \frac{2}{2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-3+3h+1+2}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h}{2h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h}{2h} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Ejercicio nº 11.-

Aplicando la definición de derivada, calcula $f'(1)$, siendo $f(x) = \frac{2}{x}$.

Solución:

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{1+h} - 2}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{2-2(1+h)}{(1+h)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{2-2-2h}{(1+h)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2h}{(1+h)h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2h}{(1+h)h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2}{(1+h)} = \frac{-2}{1} = -2 \end{aligned}$$

Ejercicio nº 12.-

Calcula, utilizando la definición de derivada, $f'(1)$ para la función $f(x) = \frac{x-1}{3}$.

Solución:

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1+h-1}{3} - 0}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h}{3}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Ejercicio nº 13.-

Halla la derivada de la función $f(x) = (x-1)^2$ en $x = 2$, aplicando la definición de derivada.

Solución:

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h-1)^2 - 1}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(h+1)^2 - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 1 + 2h - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 2h}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(h+2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (h+2) = 2 \end{aligned}$$

Ejercicio nº 14.-

Halla la derivada de la siguiente función en $x = 1$, aplicando la definición de derivada:

$$f(x) = x^2 + 1$$

Solución:

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^2 + 1 - 2}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 + h^2 + 2h + 1 - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(h+2)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (h+2) = 2 \end{aligned}$$

Ejercicio nº 15.-

Halla la derivada de la función $f(x) = 2x^2$, aplicando la definición de derivada

Solución:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2(x+h)^2 - 2x^2}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2(x^2 + h^2 + 2xh) - 2x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2x^2 + 2h^2 + 4xh - 2x^2}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h^2 + 4xh}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2h + 4x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2h + 4x) = 4x \end{aligned}$$

Ejercicio nº 16.-

Utilizando la definición de derivada, calcula $f'(x)$ para la función $f(x) = \frac{x+1}{3}$.

Solución:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{x+h+1}{3} - \frac{(x+1)}{3}}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{x+h+1-x-1}{3}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h}{3}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{3h} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Ejercicio nº 17.-

Halla $f'(x)$, aplicando la definición de derivada, siendo $f(x) = x^2 + 1$.

Solución:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 + 1 - (x^2 + 1)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + h^2 + 2xh + 1 - x^2 - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 2xh}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(h + 2x)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (h + 2x) = 2x \end{aligned}$$

Ejercicio nº 18.-

Aplicando la definición de derivada calcula $f'(x)$, siendo $f(x) = \frac{1}{x}$.

Solución:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{x - (x+h)}{x(x+h)}}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{x - x - h}{x(x+h)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{-h}{x(x+h)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{hx(x+h)} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{x(x+h)} = \frac{-1}{x^2} \end{aligned}$$

Cálculo de derivadas

Ejercicio nº 19.-

Halla la función derivada de:

a) $f(x) = 4x^3 - 3x^2 + 2$

b) $f(x) = \operatorname{tg} x$

Solución:

a) $f'(x) = 12x^2 - 6x$

b) $f'(x) = 1 + \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$

Ejercicio nº 20.-

Calcula la función derivada de:

a) $f(x) = 2x^3 - x^2 + 1$

b) $f(x) = \ln x$

Solución:

a) $f'(x) = 6x^2 - 2x$

b) $f'(x) = \frac{1}{x}$

Ejercicio nº 21.-

Halla la derivada de:

a) $f(x) = x^3 - 3x^2 + \frac{1}{5}$

b) $f(x) = \cos x$

Solución:

a) $f'(x) = 3x^2 - 6x$

b) $f'(x) = -\operatorname{sen} x$

Ejercicio nº 22.-

Halla la función derivada de las siguientes funciones:

a) $f(x) = 2x^5 + \frac{x}{3}$

b) $f(x) = \operatorname{sen} x$

Solución:

a) $f'(x) = 10x^4 + \frac{1}{3}$

b) $f'(x) = \cos x$

Ejercicio nº 23.-

Halla la función derivada de:

a) $f(x) = 3x^4 - 2x + 5$

b) $f(x) = e^x$

Solución:

a) $f'(x) = 12x^3 - 2$

b) $f'(x) = e^x$

Ejercicio nº 24.-

Calcula $f'(x)$ en cada caso:

a) $f(x) = \frac{3x^2}{2x+3}$

b) $f(x) = \sqrt[3]{x} \cdot \operatorname{sen} x$

Solución:

a) $f'(x) = \frac{6x(2x+3) - 3x^2 \cdot 2}{(2x+3)^2} = \frac{12x^2 + 18x - 6x^2}{(2x+3)^2} = \frac{6x^2 + 18x}{(2x+3)^2}$

b) $f'(x) = x^{1/3} \cdot \operatorname{sen} x$

$$f'(x) = \frac{1}{3} x^{-2/3} \operatorname{sen} x + x^{1/3} \cdot \cos x = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} \operatorname{sen} x + \sqrt[3]{x} \cdot \cos x$$

Ejercicio nº 25.-

Halla la función derivada de:

a) $f(x) = \frac{1-x^2}{x-3}$

b) $f(x) = x \ln x$

Solución:

a) $f'(x) = \frac{-2x(x-3) - (1-x^2)}{(x-3)^2} = \frac{-2x^2 + 6x - 1 + x^2}{(x-3)^2} = \frac{-x^2 + 6x - 1}{(x-3)^2}$

b) $f'(x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$

Ejercicio nº 26.-

Calcula la derivada de las funciones siguientes:

a) $f(x) = \frac{3x-1}{x^2-2}$

b) $f(x) = x^2 \operatorname{sen} x$

Solución:

a) $f'(x) = \frac{3(x^2-2) - (3x-1)2x}{(x^2-2)^2} = \frac{3x^2-6-6x^2+2x}{(x^2-2)^2} = \frac{-3x^2+2x-6}{(x^2-2)^2}$

b) $f'(x) = 2x \operatorname{sen} x + x^2 \cos x$

Ejercicio nº 27.-

Halla la función derivada de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \frac{x^2+2}{2x+1}$

b) $f(x) = xe^x$

Solución:

a) $f'(x) = \frac{2x(2x+1) - (x^2+2) \cdot 2}{(2x+1)^2} = \frac{4x^2+2x-2x^2-4}{(2x+1)^2} = \frac{2x^2+2x-4}{(2x+1)^2}$

b) $f'(x) = e^x + xe^x = (1+x)e^x$

Ejercicio nº 28.-

Halla la derivada de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \sqrt{x} + \frac{2}{x}$

b) $f(x) = \frac{3x+1}{e^x}$

Solución:

a) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{2}{x^2}$

b) $f'(x) = \frac{3e^x - (3x+1)e^x}{(e^x)^2} = \frac{e^x(3-3x-1)}{(e^x)^2} = \frac{2-3x}{e^x}$

Ejercicio nº 29.-

Halla la derivada de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \sqrt{x} + \frac{2}{x}$

b) $f(x) = \frac{3x+1}{e^x}$

Solución:

a) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{2}{x^2}$

b) $f'(x) = \frac{3e^x - (3x+1)e^x}{(e^x)^2} = \frac{e^x(3-3x-1)}{(e^x)^2} = \frac{2-3x}{e^x}$

Ejercicio nº 30.-

Calcula la derivada de la función:

$$f(x) = \sqrt{4x^3 + 1}$$

Solución:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{4x^3 + 1}} \cdot 12x^2 = \frac{12x^2}{2\sqrt{4x^3 + 1}} = \frac{6x^2}{\sqrt{4x^3 + 1}}$$

Ejercicio nº 31.-

Halla la función derivada de:

$$f(x) = (3x^2 + x)^4$$

Solución:

$$f'(x) = 4(3x^2 + x)^3 \cdot (6x + 1)$$

Ejercicio nº 32.-

Halla $f'(x)$ para la función:

$$f(x) = e^{4x^3 - 2x}$$

Solución:

$$f'(x) = e^{4x^3 - 2x} \cdot (12x^2 - 2)$$

Ejercicio nº 33.-

Calcula la función derivada de:

$$f(x) = \operatorname{sen}\left(\frac{x+1}{2x-3}\right)$$

Solución:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \cos\left(\frac{x+1}{2x-3}\right) \cdot \frac{(2x-3) - (x+1)2}{(2x-3)^2} = \frac{2x-3-2x-2}{(2x-3)^2} \cdot \cos\left(\frac{x+1}{2x-3}\right) = \\ &= \frac{-5}{(2x-3)^2} \cdot \cos\left(\frac{x+1}{2x-3}\right) \end{aligned}$$

Aplicaciones de la derivada

Ejercicio nº 34.-

Escribe la ecuación de la recta tangente a la curva $y = 2x^2 - 3x$ que tenga pendiente -7 .

Solución:

- $y' = 4x - 3$
- La pendiente de la recta es $y' = -7 \Rightarrow 4x - 3 = -7 \Rightarrow x = -1$
- Cuando $x = -1$, $y = 5$.
- La recta será:

$$y = 5 - 7(x+1) = 5 - 7x - 7 = -7x - 2$$

Ejercicio nº 35.-

Halla la ecuación de la recta tangente a la curva $y = \sqrt{x}$ que sea paralela a la recta $y = \frac{1}{4}x + 1$

Solución:

- $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
- La pendiente de la recta es $y' = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{4} \Rightarrow x = 4$
- Cuando $x = 4$, $y = 2$
- La recta será:

$$y = 2 + \frac{1}{4}(x-4) = 2 + \frac{1}{4}x - 1 = \frac{1}{4}x + 1$$

Ejercicio nº 36.-

Halla la ecuación de la recta tangente a la curva $y = x^2 + 2x - 1$ en el punto de abscisa $x = 1$.

Solución:

- $y' = 2x + 2$
- La pendiente de la recta es $y'(1) = 4$.
- Cuando $x = 1$, $y = 2$
- La recta será:

$$y = 2 + 4(x - 1) = 2 + 4x - 4 = 4x - 2$$

Ejercicio nº 37.-

Escribe la ecuación de la recta tangente a la curva $y = x^3 - 2x$ en el punto de abscisa $x = 2$.

Solución:

- $y' = 3x^2 - 2$
- La pendiente de la recta es $y'(2) = 10$.
- Cuando $x = 2$, $y = 4$.
- La ecuación de la recta será:

$$y = 4 + 10(x - 2) = 4 + 10x - 20 = 10x - 16$$

Ejercicio nº 38.-

Halla la ecuación de la recta de pendiente 7 que es tangente a la curva $y = 3x^2 + x - 1$.

Solución:

- $y' = 6x + 1$
- La pendiente de la recta es $y' = 7 \Rightarrow 6x + 1 = 7 \Rightarrow x = 1$
- Cuando $x = 1$, $y = 3$.
- La ecuación de la recta será:

$$y = 3 + 7(x - 1) = 3 + 7x - 7 = 7x - 4$$

Ejercicio nº 39.-

Averigua los puntos de tangente horizontal de la función:

$$f(x) = \frac{3 - x^2}{x + 2}$$

Solución:

- $f'(x) = \frac{-2x(x+2) - (3-x^2)}{(x+2)^2} = \frac{-2x^2 - 4x - 3 + x^2}{(x+2)^2} = \frac{-x^2 - 4x - 3}{(x+2)^2}$
- $f'(x) = 0 \Rightarrow -x^2 - 4x - 3 = 0 \Rightarrow x^2 + 4x + 3 = 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow x = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 12}}{2} = \frac{-4 \pm 2}{2} \begin{cases} x = -1 \rightarrow \text{Punto } (-1, 2) \\ x = -3 \rightarrow \text{Punto } (-3, 6) \end{cases}$

Ejercicio nº 40.-


Halla y representa gráficamente los puntos singulares de la función:

$$f(x) = x^4 - 2x^2$$

Solución:

- $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1) = 0 \begin{cases} x = -1 \rightarrow \text{Punto } (-1, -1) \\ x = 0 \rightarrow \text{Punto } (0, 0) \\ x = 1 \rightarrow \text{Punto } (1, -1) \end{cases}$
- Hallamos las ramas infinitas:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^4 - 2x^2) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^4 - 2x^2) = +\infty$$



Mínimo en $(-1, -1)$ y en $(1, -1)$; máximo en $(0, 0)$

Ejercicio nº 41.-

Determina los puntos de tangente horizontal de la función:

$$f(x) = \frac{x^3}{x+2}$$

Solución:

- $f'(x) = \frac{3x^2(x+2) - x^3}{(x+2)^2} = \frac{3x^3 + 6x^2 - x^3}{(x+2)^2} = \frac{2x^3 + 6x^2}{(x+2)^2}$
- $f'(x) = 0 \Rightarrow 2x^3 + 6x^2 = 0 \Rightarrow x^2(2x+6) = 0 \begin{cases} x = 0 \rightarrow \text{Punto } (0, 0) \\ x = -3 \rightarrow \text{Punto } (-3, 27) \end{cases}$

Ejercicio nº 42.-

Halla los puntos de tangente horizontal de la siguiente función y, con ayuda de las ramas infinitas, decide si son máximos o mínimos:


$$f(x) = x^3 + 6x^2 - 15x$$

Solución:

- $f'(x) = 3x^2 + 12x - 15 = 0 \Rightarrow x^2 + 4x - 5 = 0$

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{16+20}}{2} = \frac{-4 \pm 6}{2}; x = \frac{-4 \pm \sqrt{16+20}}{2} = \frac{-4 \pm 6}{2} \begin{cases} x=1 \rightarrow \text{Punto}(1, -8) \\ x=-5 \rightarrow \text{Punto}(-5, 100) \end{cases}$$

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 + 6x^2 - 15x) = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 + 6x^2 - 15x) = -\infty$



Máximo en $(-5, 100)$ y mínimo en $(1, -8)$.

Ejercicio nº 43.-

Halla y representa gráficamente los máximos y mínimos de la función:


$$y = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$$

Solución:

• $y' = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 0 \Rightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{4+12}}{2} =$
 $= \frac{2 \pm 4}{2}$ $x=3 \rightarrow \text{Punto}(3, -26)$
 $x=-1 \rightarrow \text{Punto}(-1, 6)$

• Hallamos las ramas infinitas para saber si son máximos o mínimos:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - 3x^2 - 9x + 1) = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 3x^2 - 9x + 1) = -\infty$



Máximo en $(-1, 6)$ y mínimo en $(3, -26)$.

Ejercicio nº 44.-

Dada la función:

$$f(x) = 2x^3$$

determina los tramos en los que la función crece y en los que decrece.

Solución:

- $f'(x) = 6x^2$
- Como $f'(x) \geq 0$ la función es creciente

Ejercicio nº 45.-

Estudia el crecimiento y el decrecimiento de la siguiente función:

$$f(x) = 3x^2 - 2x + 1$$

Solución:

- $f'(x) = 6x - 2$
- Estudiamos el signo de la derivada:
 $6x - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$
 $6x - 2 > 0 \Rightarrow 6x > 2 \Rightarrow x > \frac{2}{6} \Rightarrow x > \frac{1}{3}$
 $6x - 2 < 0 \Rightarrow 6x < 2 \Rightarrow x < \frac{1}{3}$
- La función decrece en $\left(-\infty, \frac{1}{3}\right)$, crece en $\left(\frac{1}{3}, +\infty\right)$ (y tiene un mínimo en $x = \frac{1}{3}$).

Ejercicio nº 46.-

Estudia dónde crece y dónde decrece la función:

$$f(x) = 3 + 12x - 3x^2$$

Solución:

- $f'(x) = 12 - 6x$
- Estudiamos el signo de la derivada:
 $12 - 6x = 0 \Rightarrow x = 2$
 $12 - 6x > 0 \Rightarrow 12 > 6x \Rightarrow 6x < 12 \Rightarrow x < 2$
 $12 - 6x < 0 \Rightarrow 12 < 6x \Rightarrow 6x > 12 \Rightarrow x > 2$
- La función es creciente en $(-\infty, 2)$ y decreciente en $(2, +\infty)$ (y tiene un máximo en $x = 2$).

Ejercicio nº 47.-

Estudia el crecimiento y el decrecimiento de la función:

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 1}{2}$$

Solución:

- $f'(x) = \frac{2x - 3}{2}$
- Estudiamos el signo de la derivada:

$$\frac{2x-3}{2} = 0 \Rightarrow 2x-3=0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$$

$$\frac{2x-3}{2} > 0 \Rightarrow 2x-3 > 0 \Rightarrow 2x > 3 \Rightarrow x > \frac{3}{2}$$

$$\frac{2x-3}{2} < 0 \Rightarrow 2x-3 < 0 \Rightarrow 2x < 3 \Rightarrow x < \frac{3}{2}$$

- La función decrece en $\left(-\infty, \frac{3}{2}\right)$ y crece en $\left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$ (y tiene un mínimo en $x = \frac{3}{2}$).

Ejercicio nº 48.-

Halla los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función:

$$f(x) = (x+2)^2$$

Solución:

- $f'(x) = 2(x+2)$
- Estudiamos el signo de la derivada:

$$2(x+2) = 0 \Rightarrow x+2 = 0 \Rightarrow x = -2$$

$$2(x+2) > 0 \Rightarrow x+2 > 0 \Rightarrow x > -2$$

$$2(x+2) < 0 \Rightarrow x+2 < 0 \Rightarrow x < -2$$

- La función decrece en $(-\infty, -2)$ y crece en $(-2, +\infty)$ (y tiene un mínimo en $x = -2$).